

Infobrief von Ihrem Fachberater für Imkerei am Regierungspräsidium Stuttgart

2023-06-26

Die Infobriefe können unter
<https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt3/ref33/seiten/bienen-ag>
abgerufen werden.

Weissacher Imkertag:

2024 wird der Weissacher Imkertag zum 50. Mal veranstaltet. Ich hatte seit 2012 die Aufgabe ein für Sie interessantes Programm zusammenzustellen. Vielleicht haben aber SIE auch einen besonderen Wunsch, den man bei der Themenauswahl EVENTUELL berücksichtigen könnte - kommen Sie gerne auf mich zu!

Trachtsituation:

Über die aktuellen Trachtverhältnisse können Sie sich über die Seite der Verbände unter dem Stichwort „Waagstockdaten“ informieren. Sie werden beim Anklicken auf die Seite „Trachtmeldedienste der Landesverbände Badischer und Württembergischer Imker“ geführt, bei dem Sie die Anmelde-daten eingeben müssen, die Sie über Ihren Verein erhalten haben.

The image shows two screenshots. The left one is the homepage of https://www.lwvi.de, featuring a green navigation bar with 'HOME' and 'VERBAND' buttons, and a 'ZUM VERBAND' button. The right screenshot is the 'Trachtmeldedienst' interface, displaying a map of Baden-Württemberg divided into sectors A-H. A table on the right shows data for 'Sektor B' on '25.06.2023'.

Datum	Tracht	Zunahme	Temp. ↑	Temp. ↓	Regen
Sektor B	25.06.2023				Keine Daten
BADEN B-V1		-0,4			
BADEN B-V2		+0,5			
BADEN B-V3		+1,1			
BADEN B-V4		0,0			
BADEN B-V5		-0,1			
BADEN B-V6		-0,3			
BADEN B1		+2,0			
LWVI-B		+0,3			
LWVI-B1		-0,1			
LWVI-BV1		-0,3			
LWVI-E5		-0,1			
LWVI-CP2		+0,3			
LWVI-MP3		+0,3			

Durch Anklicken der Regionen erscheinen die dort aufgestellten Waagen, sofern die Betreiber die Daten korrekt einpflegen.

Schwarmtrieb:

Eigentlich hatte ich bei mir den Schwarmtrieb schon seit einiger Zeit „zu den Akten gelegt“. Glücklicherweise konnte ich mich dann zufällig an diesem phantastischen Naturschauspiel am letzten Samstag um 15h Sommerzeit bei einem meiner Völker am Haus erfreuen!



Besonders schön war, dass der Schwarm sich nicht am Kaffeetisch der Nachbarn, sondern auf der Wiese nebenan niedergelassen hat - in 60-80cm Höhe ideal zum Einschlagen.

Einen Schwarm unter solchen Bedingungen zu fangen ist ein Kinderspiel und bedarf nur einer Sprühflasche mit Wasser. Am Abend wird das Flugloch verschlossen und der Schwarm am gewünschten Standplatz aufgestellt. Wer sicherstellen will, dass der Schwarm nicht wieder auszieht kann entweder eine umständliche Kellerhaft, oder das deutlich einfachere Einhängen einer Wabe mit offener Brut in Erwägung ziehen.

Nachdem sich der Schwarm stabilisiert hat, wird er mit Oxalsäure behandelt, bevor zu viele ältere Maden vorhanden sind. So sollte das Volk dann vorerst saniert sein.

Jungvolkpflege:

Immer wieder mal nachsehen, ob Futter erforderlich ist – unsinniges überfüttern ist kontraproduktiv und behindert eine zügige und gesunde Entwicklung der Ableger!

Man sollte sich auch angewöhnen, dass man sich von schlechten Königinnen frühzeitig trennt!

Viel Erfolg!

Thomas Kustermann

Fachberatung Imkerei am Regierungspräsidium Stuttgart